


LA MALADIE

La **Diarrhée Virale Bovine (BVD)** est une maladie des bovins aux signes cliniques variables. elle n'est pas transmissible à l'homme.

Le pouvoir immunodépresseur du virus influence fortement la santé générale du troupeau. **La BVD peut être responsable des problèmes reproducteurs, pathologies néonatales et chutes de production.**

L'infection du troupeau peut passer inaperçue mais engendrer la naissance de veaux IPI dans les mois qui suivent.


Cette maladie se transmet par contact entre un animal sain et un animal infecté, ou in utero de la mère au veau.



COMMENT MON TROUPEAU PEUT IL ÊTRE INFECTÉ ?

Les portes d'entrée principales de la BVD :

- Pâturage
- Introduction d'un bovin
- Participation à des concours
- Matériels contaminés




QU'EST CE QU'UN BOVIN VIRÉMIQUE TRANSITOIRE ?



Un bovin infecté après sa naissance est un virémique transitoire. Il porte et excrète le virus temporairement jusqu'à développer sa réponse immunitaire et éliminer progressivement le virus. Il ne sera donc virémique que quelques temps puis redeviendra sain. Durant la virémie, l'animal est particulièrement sensible aux autres pathologies. Si c'est une femelle gestante, elle pourra donner naissance à un veau IPI.

QU'EST CE QU'UN BOVIN IPI ?

Un bovin IPI (Infecté Permanent Immunotolérant) est un animal qui porte et excrète le virus de sa naissance à sa mort. **Il est la source principale de contamination des autres animaux.** Un animal devient IPI lorsqu'il est infecté durant la gestation, entre le 30ème et 125ème jour. Une femelle IPI peut même devenir gestante et dans ce cas, elle donnera toujours naissance à un veau IPI.



COMMENT DIAGNOSTIQUER UN IPI ?

Contrairement aux idées reçues, l'animal IPI n'est pas toujours le plus chétif du lot.

Un IPI peut atteindre l'âge adulte et vivre plusieurs années en apparence bonne santé.

Le seul moyen de savoir si un animal est IPI est d'avoir recours à un dépistage virologique.