




CLAVELÉE OU VARIOLE CAPRINE

Actualités au 27/02/2026

- Bulgarie : 183 foyers recensés depuis le 1er juillet 2025.
- Grèce : 50 foyers détectés sur les quatre dernières semaines. Soit depuis le mois de juillet 2025, 1 558 foyers ont été recensés. La circulation virale marquée en Grèce dans plusieurs régions du nord, du centre et de l'est du pays, peut s'expliquer par la forte densité animale, le faible niveau de biosécurité et les mouvements illégaux.
- Macédoine du Nord : 3 foyers détectés depuis le 23 janvier 2026 dans des élevages ovins.
- Roumanie : aucune nouvelle déclaration récente, mais 21 foyers recensés depuis le 1er juillet 2025.
- Serbie : pas de nouveau cas signalé ; trois foyers ont été détectés depuis le premier cas enregistré le 17 septembre 2025.



La clavelée ou variole caprine est une maladie de catégorie A au niveau Européen, classée au même rang sanitaire que la dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC). C' est à dire à éradication obligatoire et immédiate.

Elle est due à un virus appelé Capripoxvirus de la famille des Poxvirus. Le virus peut survivre six mois dans les croûtes sèches et plusieurs mois dans la laine. Ce virus touche les ovins et caprins de tout âge, **il est très contagieux**.

Transmission

- Contact direct : avec des individus infectés, via les lésions ou par le biais des sécrétions respiratoires des individus atteints.
- Contact indirect : inhalation des particules infectées véhiculées dans l'air ou par l'intermédiaire des matériaux (eau, litière...).

Les formes cliniques

La période d'incubation de cette maladie est comprise entre 4 et 21 jours (en moyenne 7 à 14 jours).

Chez les moutons / chèvres, on distingue :

- **la forme classique vésiculeuse en 4 quatre phases :**
 1. **Invasion** (2 à 4 jours) hyperthermie ; abondantes sécrétions lacrymales, salivaire et nasale ; oedème palpébral; photophobie.
 2. **Eruption** (3 à 4 jours) apparition de taches rouges ou rosées qui s'étendent et se transforment en papules de 6 à 20mm de diamètre.
 3. **Sécrétion** avec un affaissement des papules, et leur infiltration par un liquide jaune-rougeâtre, puis transformation en vésicules.
 4. **Dessiccation** (4 à 5 jours) avec formation de croûtes qui se détachent.
- **la forme classique nodulaire** : les papules évoluent d'emblée en nodules qui ensuite se nécrosent et chutent.
- **les formes compliquées** : détresse respiratoire, jetage abondant, symptômes nerveux.

